

Transportuj tylko towary, a nie afrykański pomór świń!

Afrykański pomór świń to śmiertelnie niebezpieczna choroba wirusowa, która roznosi się łatwo wśród świń poprzez bezpośredni kontakt z zarażonymi zwierzętami lub z ich wydzielinami ustrojowymi (wydzielina z nosa, ślina, odchody, krew) lub tkankami (mięso). Wirus przenosi się również pośrednio, przez kontakt ze skażonymi obiektami takimi jak pojazdy, sprzęt, obuwie i odzież. Ludzie nie ulegają zarażeniu, lecz mogą przenosić wirusy na zwierzęta poprzez skażone urządzenia, żywność i odzież.

Działania przyczyniające się do roznoszenia wirusa:

- Niewłaściwe czyszczenie kół ciężarówek i ładowni.
- Kontakt z zarażonymi świniami, żywymi lub martwymi, zarówno domowymi, jak i dzikimi.
- Niewłaściwa utylizacja świńskich tuszy.
- Karmienie świń odpadami żywnościowymi.
- Niewłaściwe zagospodarowanie (potencjalnie) zarażonego mięsa wieprzowego (np. mięso peklowane lub produkty wędzone).



Dobre praktyki dla firm transportowych dla uniknięcia rozprzestrzenienia się wirusa ASF.

Wszelkie obiekty skażone wirusem ASF takie jak odzież, pojazdy i inny sprzęt mogą przenosić wirusa. Dlatego zalecamy podjęcie następujących działań higienicznych niezwłocznie po wykryciu ASF w kraju, w którym prowadzicie działalność:

1. Mycie rąk przed i po wizycie na fermie trzody.
2. Noszenie odpowiedniej odzieży ochronnej i obuwia na fermie, należy pamiętać o dezynfekcji odzieży i obuwia po wizycie na fermie.
3. Czyszczenie i dezynfekcja pojazdów i sprzętu przed i po wizycie na fermie; należy pamiętać o usunięciu wszelkiego materiału organicznego przed dezynfekcją! Pojazdy i sprzęt obejmują: koła ciężarówek i ładownie, miotły używane do czyszczenia ładowni i węże używane do wyładunku pasz.
4. Nie wolno zabierać z fermy żadnych towarów, takich jak big bagi, puste opakowania i (opakowane) pasze dla zwierząt, które miały kontakt ze zwierzętami.

Więcej informacji: [European Commission](#), [EFSA](#)


Kraje wysokiego ryzyka w Europie

Legenda do ilustracji:

- Poziom I:** Afrykańskiego pomoru świń jeszcze nie ma, lecz jest podwyższone ryzyko epidemii. Obowiązek zwiększonego nadzoru nad populacją dzików i świń hodowlanych.
- Poziom II:** Afrykański pomór świń występuje u dzików.
- Poziom III:** Afrykański pomór świń występuje u dzików i świń hodowlanych lecz nie jest jeszcze permanentny.
- Poziom IV:** Afrykański pomór świń występuje stale wśród dzików i świń hodowlanych.

Data ilustracji: styczeń 2021

Fioletowy PRZYCISK, aby zobaczyć mapę epidemii.



Jeśli znajdziesz martwego dzika, nigdy go nie dotykaj;
zgłoś swoje odkrycie do lokalnych władz.

Skontaktuj się z lokalnymi władzami